



БорСТАРТ

НОВЫЙ БОР С ВЫСОКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Бор

- ▶ участвует в росте меристем (корневое и листовое развитие).
- ▶ играет жизненно важную роль в процессах опыления и плодоношения
- ▶ является важным условием для накопления масла

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Высоко качественная композиция пентобората и сорбитола.
- ▶ Микронизация частиц для лучшего проникновения в растение.
- ▶ Снижение поверхностного натяжения
- ▶ Лучшее смешивание с другими препаратами
- ▶ Более низкая норма применения (1 л/га вместо 1,5)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Доза	Фаза применения
Сахарная свекла	1 л/га	в фазе 6 листьев
	1 л/га	через 14 дней после первой обработки
	1 л/га	в фазе смыкания рядков
Подсолнечник	1–2 л/га	от 3 пар настоящих листьев до цветения
Рапс озимый	1 л/га	Осень: в фазе 6–8 листьев
	1–2 л/га	Весна: 1–2 л/га от начала удлинения стебля до цветения
Рапс яровой	1–2 л/га	от начала удлинения стебля до цветения
Горох, соя, конские бобы	1,5 л/га	в фазу 5–6 листьев однократно

Размер полиолов по сравнению с другими молекулами, используемыми при разработке листовых удобрений


Полиолы (Sorbitol)  в 40 раз меньше, чем хелаты

Глюкогептонат 

Хелаты 

Аминокислота  в 4 раза больше, чем хелаты

Сравнение распределения на листьях между жидким бором старого поколения и БорСТАРТ



бор старого поколения 150 г/л

БорСТАРТ

Содержание: в 9,2% (120 г/л)



суффле
АГРО РУС

www.soufflet-agro.ru

FERTEQ

GUARTEQ


ADTEQ

SOILTEQ

ПОЧЕМУ И КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОРСТАРТ

- ▶ БорСТАРТ предотвращает дефицит бора на чувствительных культурах, таких как сахарная свекла, подсолнечник, рапс, бобовые и другие.
- ▶ Дефицит бора может возникнуть в следующих ситуациях:
 - легкие почвы (песчаные, известково-глинистые и прочие);
 - избыток калия в почве.
- ▶ В случае засухи, питание растения через корни ограничено.

СОСТАВ:



БорСТАРТ

БОР


Концентрированная суспензия для использования по листу.

Содержит полиолы и другие вещества растительного происхождения


Мягкое и лучшее поглощение растением

Безопасный для растения, окружающей среды и человека

ТЕСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА РАПСЕ (в т/га)



ТЕСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ (в т/га)



БорСТАРТ 120 г/л с меньшей гектарной нормой более эффективен, чем бор старого поколения 150 г/л при полной дозировке.

Дефицит бора на рапсе



Блокированный рост стручков

Дефицит бора на сахарной свекле



Гниль сердечка


Дефицит бора на подсолнечнике




Ломкость стебля



Утолщенный и полый корень с некротическим центром



Новые листья из точки роста темнеют и отмирают



Подсушенная листовая пластина



суффле
АГРО РУС

ООО „Суффле Агро Рус“

399059, Россия, Липецкая область, г. Грязи, ул. Хлебозаводская, д.7

Телефон: +7 (47461) 3 02 69 факс 2 61 97

www.soufflet-agro.ru